Astérisque

T. JEULIN

Filtrations, sous-filtrations : propriétés élémentaires

Astérisque, tome 236 (1996), p. 163-170
<http://www.numdam.org/item?id=AST_1996__236__163_0>

© Société mathématique de France, 1996, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la collection « Astérisque » (http://smf4.emath.fr/Publications/Asterisque/) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM
Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
http://www.numdam.org/

Filtrations, sous-filtrations : propriétés élémentaires

T. Jeulin

Résumé. — Nous donnons des conditions simples pour qu'il existe des martingales continues (ou plus précisément un mouvement brownien) adaptées à une filtration.

Le but de cette note est essentiellement de montrer les résultats suivants :

Théorème 1 *Soit T une variable aléatoire positive définie sur l'espace probabilisé complet $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$; $\mathcal{T}$ est la plus petite filtration [continue à droite, complète] faisant de T un temps d'arrêt. Il existe un processus non constant $\mathcal{T}$-adapté, qui est une martingale continue [dans sa propre filtration] si et seulement si la loi de T a une partie diffuse.*

Théorème 2 *Soit X un processus, à valeurs dans $\mathbf{R}^d$, à accroissements indépendants stationnaires, sans partie gaussienne, de mesure de Lévy ν, $\mathcal{X}$ la filtration qu'il engendre. Il existe un mouvement brownien B adapté à la filtration $\mathcal{X}$ si et seulement si $\nu[\mathbf{R}^d]$ est infini.*

Soulignons que si B existe, ce n'est pas un $\mathcal{X}$-mouvement brownien, ou, de façon équivalente une $\mathcal{X}$-martingale, puisque l'on sait que les $\mathcal{X}$-martingales sont purement discontinues.

Théorème 3 *Soit $\mathcal{F} = (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ une filtration vérifiant les conditions habituelles. Une condition nécessaire et suffisante pour qu'il existe un mouvement brownien $\mathcal{F}$-adapté est :*

pour tout $t > 0$, il existe une v.a. U_t $\mathcal{F}_t$-mesurable, de loi diffuse.

Dans la suite, Φ désigne une application mesurable de $[0,1]$ dans $C(\mathbf{R}_+, \mathbf{R})$ transformant la mesure de Lebesgue λ_1 en la mesure de Wiener $\mathbf{P}_0$.

I. Soit T une variable aléatoire positive définie sur l'espace probabilisé complet $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$, μ sa loi et F_μ sa fonction de répartition. On désigne par $(\mathcal{T}_t)_{t>0}$ la plus petite filtration [continue à droite, complète] faisant de T un temps d'arrêt ([3], Chapitre 5, exemple p. 122-124).

Supposons dans un premier temps μ purement atomique. Soit $\mathcal{G}$ une sous-filtration de $\mathcal{T}$. $\sigma(T)$ étant [complétée d'une tribu] atomique, on sait ([8], [5]) que toute $\mathcal{G}$-martingale locale est une $\mathcal{H}$-semimartingale si

$$\mathcal{H}_t = \bigcap_{s>t} (\mathcal{G}_s \vee \sigma(T)) = \mathcal{T}_\infty.$$

Puisque $\mathcal{H}_0 = \mathcal{T}_\infty$, les $\mathcal{H}$-martingales [locales] sont des processus constants et toute $\mathcal{G}$-semimartingale est à variation finie. Les seules martingales continues $\mathcal{T}$-adaptées sont donc constantes.

Supposons maintenant que la partie diffuse μ_c de μ n'est pas nulle et notons C_μ l'ensemble des points de continuité de F_μ. Soit $0 < a < b$, avec

$$\mu_c\big[\,]a, b[\,\big] \neq 0.$$

Conditionnellement à $\{T \in C_\mu\,,\ a < T < b\}$ la loi de T est diffuse*, de fonction de répartition

$$F_{\mu,a,b}(x) = 1_{\{a \leq x\}} \frac{\mu_c\big[\,]a, x \wedge b[\,\big]}{\mu_c\big[\,]a, b[\,\big]}$$

et $F_{\mu,a,b}(T)$ est uniforme sur $[0,1]$.

$$Y_t = 1_{\{b \leq t\}} 1_{\{T \in C_\mu\,,\ a<T<b\}} \big(\Phi \circ F_{\mu,a,b}(T)\big)_{t-b} \text{ convient :}$$

▷ $\forall t \geq 0, Y_t$ est $\mathcal{T}_t$-mesurable : c'est évident si $t < b$; sinon :
$\{T \in C_\mu\,,\ a < T < b\} \in \mathcal{T}_b$;
$Y_t = 1_{\{T \in C_\mu\,,\ a<T<b\}} \big(\Phi \circ F_{\mu,a,b}(T \wedge b)\big)_{t-b}$ est $\mathcal{T}_b$-mesurable;

▷ Si $(\mathcal{Y}_t)_{t \geq 0}$ est la filtration [continue à droite, complète] engendrée par Y,

$$\{T \in C_\mu\,,\ a < T < b\} = \bigcap_{n \in \mathbf{N}^*} \{\exists t \in \,]b, b + \tfrac{1}{n}[\,,\ Y_t \neq 0\} \in \mathcal{Y}_b$$

et pour $0 = t_0 < t_1 = b \leq \ldots \leq t_n$, $\varphi_0, \ldots, \varphi_n$ boréliennes sur $\mathbf{R}$,

$$\begin{aligned}
&\mathbf{E}\Big[\prod_{0 \leq k \leq n} \varphi_k(Y_{t_k})\,;\ T \in C_\mu\,,\ a < T < b\Big] \\
&\qquad = \varphi_0(0)\ \mathbf{E}\Big[\prod_{1 \leq k \leq n} \varphi_k\Big(\big(\Phi \circ F_{\mu,a,b}(T)\big)_{t_k - b}\Big), T \in C_\mu\,,\ a < T < b\Big] \\
&\qquad = \varphi_0(0)\ \mu\big[\,]a, b[\,\big]\ \mathbf{P}_0\Big[\prod_{1 \leq k \leq n} \varphi_k(\xi_{t_k - b})\Big].
\end{aligned}$$

* On travaille de fait avec la partie $\mathcal{T}$-totalement inaccessible de T.

On en déduit facilement que Y est une $\mathcal{Y}$-martingale continue, de processus croissant

$$\langle Y, Y\rangle_t = 1_{\{T\in C_\mu\,,\, a<T<b\}}(t-b)_+.$$

D'où le théorème 1.

Sous les mêmes conditions sur T, soit $a = (a_n)_{n\in\mathbf{Z}}$ une suite croissante (à valeurs dans $\overline{\mathbf{R}}_+$) avec

$$\inf_n a_n = 0,\ \sup_n a_n = \infty$$

et soit

$$T^{(a)} = \sum_{n\in\mathbf{Z}} a_{n+1} 1_{\{T\in C_\mu,\, a_n<T\le a_{n+1}\}} + \infty 1_{\{T\notin C_\mu\}},$$

$$Y_t^{(a)} = \sum_{\{n\in\mathbf{Z}\,|\,\mu_c\left[\,]a_n,a_{n+1}[\,\right]>0\}} 1_{\{T\in C_\mu,\, a_n<T\le a_{n+1}\le t\}}\left(\Phi\circ F_{\mu,a_n,a_{n+1}}(T)\right)_{t-a_{n+1}}.$$

$Y^{(a)}$ est une $(\mathcal{Y}_t^{(a)})$-martingale continue, de processus croissant

$$\left\langle Y^{(a)}, Y^{(a)}\right\rangle_t = \left(t - T^{(a)}\right)_+.$$

Remarques

1) Toute $\mathcal{T}$-martingale locale est purement discontinue. Cette dernière propriété peut donc être perdue si on diminue la filtration.

2) Ce travail a son origine dans l'étude de la notion suivante, introduite par Yor :

une filtration $\mathcal{U}$ est dite automatique si pour toute sous-filtration $\mathcal{V}$ de $\mathcal{U}$, toute $\mathcal{V}$-semi-martingale est une $\mathcal{U}$-semi-martingale.

Proposition 1 *La filtration $\mathcal{U}$ est automatique si et seulement si*

$$(\natural)\quad \forall t\ge 0,\ \mathcal{U}_t \textit{ est atomique [aux ensembles } \mathbf{P}\textit{-négligeables près].}$$

Démonstration. Vu le théorème de Stricker ([10]), une sous-filtration d'une filtration automatique est automatique; d'après la remarque *1*), dans une filtration automatique $\mathcal{U}$, les temps d'arrêt ont des lois atomiques; si $\mathbf{P}\,|_{\mathcal{U}_t}$ n'était pas atomique, il existerait une variable aléatoire réelle η, $\mathcal{U}_t$-mesurable telle que $\mathbf{P}_\eta$ ait une partie diffuse; $t+|\eta|$ serait un $\mathcal{U}$-temps d'arrêt de loi non atomique. Inversement si $\mathcal{U}$ vérifie ($\natural$), toute sous-filtration $\mathcal{V}$ de $\mathcal{U}$ vérifie aussi ($\natural$) et toute $\mathcal{V}$-martingale est à variation finie. □

Une filtration automatique $\mathcal{U}$ vérifie la propriété

($\flat$) toute $\mathcal{U}$-martingale est à variation finie.

D'après la caractérisation de Jacod et Skorohod ([4]-théorème 1) des filtrations vérifiant ($\flat$), une filtration $\mathcal{U}$ est automatique si, et seulement si, il existe une suite croissante $(T_n)_{n\in\mathbf{N}}$ de $\mathcal{U}$-temps d'arrêt avec :

$$T_0 = 0,\ \sup_n T_n = \infty,\ \mathcal{U}_t = \mathcal{U}_{T_n} \text{ sur } \{T_n \leq t < T_{n+1}\}$$

et $\forall n \in \mathbf{N}, \mathcal{U}_{T_n}$ est une tribu atomique.

3) Supposons μ non atomique; soit Y une martingale continue $\mathcal{T}$-adaptée, $\mathcal{Y}$ la filtration qu'elle engendre et

$$\tau = \inf\{t \mid Y_t \neq Y_0\}\ \big(= \inf\{t \mid \langle Y, Y\rangle_t > 0\}\big)$$

τ est un $\mathcal{Y}$- (et un $\mathcal{T}$-) temps d'arrêt vérifiant $T \leq \tau$; il existe donc $\phi : \mathbf{R}_+ \to \overline{\mathbf{R}}_+$ borélienne avec $\phi(x) \geq x$ pour μ-presque tout x et $\tau = \phi(T)$; les fonctions ϕ admissibles sont celles pour lesquelles la loi de T (sur $\{T < \infty\}$) conditionnellement à $\phi(T)$ est diffuse, i.e. telles que :

$$(\clubsuit) \text{ pour toute } h \text{ borélienne sur } \overline{\mathbf{R}}_+,\ \mathbf{P}[h \circ \phi(T) = T\,;\ T < \infty] = 0.$$

Conditionnellement à τ, les martingales continues sont constantes après τ sur les atomes de la loi conditionnelle de T sachant τ, d'où la nécessité de ($\clubsuit$). Inversement, soit V un noyau de $(\overline{\mathbf{R}}_+, \overline{\mathcal{R}}_+)$ dans lui même tel que $V(\tau, A)$ soit une version [régulière] de l'espérance conditionnelle $\mathbf{P}[T \in A \mid \phi(T)]$; sous ($\clubsuit$), on peut supposer :

$$\forall t \in \mathbf{R}_+, V(t, .) \text{ est une probabilité diffuse portée par } \mathbf{R}_+\ ;$$

le processus

$$(\omega, t) \to Y_t(\omega) = 1_{\{\tau(\omega)\leq t\}}\ \Phi\big(V(\tau(\omega), [0, T(\omega)])\big)_{t-\tau(\omega)}$$

a les propriétés requises.

II. Supposons données sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ une filtration $\mathcal{F} = (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ vérifiant les conditions habituelles et une suite $(T_r)_{r\geq 0}$ de $\mathcal{F}$-temps d'arrêt *indépendants*, tels que

$$\text{pour tout } r,\ T_r \text{ a une loi diffuse } \mu_r.$$

Pour chaque r on choisit $0 < a_r < b_r$ avec $\mu_r\big[\,]a_r, b_r[\,\big] \neq 0$; on construit comme en I

$$Y_t^{(r)} = 1_{\{b_r\leq t\}} 1_{\{a_r<T_r<b_r\}} \big(\Phi \circ F_{\mu_r, a_r, b_r}(T)\big)_{t-b_r}.$$

Les processus $Y^{(r)}$ sont adaptés à la filtration $\mathcal{F}$, indépendants. Désignons par $\mathcal{U}$ la filtration engendrée par la famille $(Y^{(r)})_{r\geq 0}$; chaque $Y^{(r)}$ est une $\mathcal{U}$-martingale continue, de processus croissant

$$\big\langle Y^{(r)}, Y^{(r)}\big\rangle_t = 1_{\{a_r<T_r<b_r\}}(t - b_r)_+$$