

350

ASTÉRISQUE

2013

L'ENSEMBLE DE ROTATION AUTOUR D'UN POINT FIXE

Frédéric Le Roux

SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE

Publié avec le concours du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Astérisque est un périodique de la Société mathématique de France.

Numéro 350, 2013

Comité de rédaction

Guy DAVID	Fabrice PLANCHON
Olivier DEBARRE	Raphaël ROQUIER
Damien GABORIAU	Wolfgang SOERGEL
Patrice LE CALVEZ	Wendelin WERNER
Robert Alain OLIVER	
Yves ANDRÉ (dir.)	

Diffusion

Maison de la SMF	AMS
Case 916 - Luminy	P.O. Box 6248
13288 Marseille Cedex 9	Providence RI 02940
France	USA
smf@smf.univ-mrs.fr	www.ams.org

Tarifs

Vente au numéro : 35 € (\$52)

Abonnement Europe : 484 €, hors Europe : 523 € (\$784)

Des conditions spéciales sont accordées aux membres de la SMF.

Secrétariat : Nathalie Christiaën

Astérisque
Société Mathématique de France
Institut Henri Poincaré, 11, rue Pierre et Marie Curie
75231 Paris Cedex 05, France
Tél : (33) 01 44 27 67 99 • Fax : (33) 01 40 46 90 96
revues@smf.ens.fr • <http://smf.emath.fr/>

© Société Mathématique de France 2013

Tous droits réservés (article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle). Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'éditeur est illicite. Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du CPI.

ISSN 0303-1179

ISBN 978-2-85629-366-9

Directrice de la publication : Aline Bonami

350

ASTÉRISQUE

2013

L'ENSEMBLE DE ROTATION AUTOUR D'UN POINT FIXE

Frédéric Le Roux

SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE

Publié avec le concours du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Frédéric Le Roux
Université Paris Sud
Laboratoire de mathématiques, Bat. 425
91405 Orsay Cedex, France
lerouxf@math.jussieu.fr

Classification mathématique par sujet (2000). — 37E30, 37C25.

Mots-clefs. — Homéomorphisme de surface, nombre de rotation, indice, orbites périodiques.

L'ENSEMBLE DE ROTATION AUTOUR D'UN POINT FIXE

Frédéric LE ROUX

Résumé. — Étant donné un point fixe pour un homéomorphisme de surface, on peut définir un *ensemble de rotation autour du point fixe*, qui est un invariant de conjugaison locale. Ce mémoire commence l'étude de cet invariant et de ces liens avec d'autres propriétés dynamiques, en particulier l'existence d'orbites périodiques, la différentiabilité au point fixe, l'indice de Poincaré-Lefschetz lorsque le point fixe est isolé.

Abstract (The rotation set around a fixed point for surface homeomorphisms). — Given a fixed point for a surface homeomorphism, one can define a rotation set around this fixed point, which is a conjugacy invariant. We initiate the study of this invariant. In particular, we explore the links with other dynamical properties such as the existence of periodic orbits, the differentiability at the fixed point, the Poincaré-Lefschetz index when the fixed point is isolated.

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos	vii
Organisation du texte	vii
Contenu	viii
Remerciements	viii
1. Le nombre de rotation, du cercle aux surfaces	1
1.1. Le nombre de rotation des homéomorphismes croissants du cercle ...	1
Les nombres de rotation vus par Poincaré	3
1.2. Des modèles linéaires aux homéomorphismes du plan	5
1.3. L'ensemble de rotation dans les anneaux	6
a. L'anneau compact	7
b. L'anneau ouvert : un problème de sélection	8
1.4. Discussion	9
2. L'ensemble de rotation autour d'un point fixe	13
2.1. Le décor	13
2.2. L'ensemble de rotation local	14
2.3. Éclatements, différentiabilité	20
a. Éclatements et ensemble de rotation	20
b. Un critère d'éclatement	22
c. Éclatement et différentiabilité	24
2.4. L'intervalle de rotation	27
a. Définition	27
b. Exemple : les points fixes paraboliques	29
c. Propriétés	30
d. Lien entre ensemble et intervalle de rotation	35
2.5. Discussion	35
3. Quand ça tourne	39
3.1. Le théorème feuilleté équivariant	39
a. Énoncé global	39
b. Exemples	40
c. Une version locale	41
d. Stabilité	41

3.2. Détection des orbites périodiques	42
a. L'anneau compact	42
b. Version locale du théorème de Poincaré-Birkhoff-Franks	44
3.3. Ensemble et intervalle de rotation	45
3.4. Le nombre de rotation de Le Calvez	51
a. La classification de P. Le Calvez	51
b. L'ensemble de rotation des points indifférents	52
3.5. Le sens de rotation de Matsumoto	55
a. La définition de S. Matsumoto	55
b. Généralisation	56
3.6. Discussion	58
4. ... et quand ça ne tourne pas	65
4.1. Énoncés	65
4.2. Bonnes isotopies	67
a. Exemple, définition	67
b. Existence	69
c. Indice d'un feuilletage transverse	71
d. Preuve du théorème 4.1.1 et de l'addendum 4.1.4	73
4.3. Points fixes d'indice > 1	73
4.4. Points fixes d'indice < 1	74
a. Secteurs hyperboliques purs et branches stables	74
b. Perturbation d'un feuilletage localement transverse	75
4.5. Points fixes de type Selle	79
4.6. Discussion	81
5. Épilogue : le théorème des trois-quatre points fixes	87
5.1. Énoncé	87
5.2. Démonstration	87
A. Extension des dynamiques locales	93
B. Dynamique locale des feuilletages	97
B.1. Classification	97
B.2. Définitions	98
B.3. Le type Cycle	100
B.4. Absence de récurrence en l'absence de feuille-cercle	100
B.5. Les types Puits ou Source, Pétale et Selle	102
B.6. Le type Mixte	105
Bibliographie	107

AVANT-PROPOS

Ce texte traite de la dynamique topologique locale en dimension deux, autrement dit de l'itération d'un germe d'homéomorphisme de surface au voisinage d'un point fixe. Nous avons choisi d'aborder le sujet avec le point de vue de *l'ensemble de rotation*, qui décrit avec quelles vitesses les points proches du point fixe lui tournent autour, et en privilégiant, parmi les outils techniques, les *feuilletages transverses* introduits récemment par Patrice Le Calvez.

Le concept de nombre de rotation a été précisé dans des cadres variés : Henri Poincaré l'a introduit pour les homéomorphismes du cercle, Sol Schwartzman a proposé de l'étendre aux champs de vecteurs sur une variété quelconque, Michal Misiurewicz et Krystyna Ziemian ont étudié le cas des homéomorphismes isotopes à l'identité sur le tore de dimension deux ; on peut encore citer l'invariant de Calabi, ou *flux* des difféomorphismes symplectiques, qui est un nombre de rotation moyen. Dans le cadre qui nous intéresse ici, Patrice Le Calvez, seul ou avec Jean-Christophe Yoccoz, a défini des nombres de rotation dans certaines situations particulières. Auparavant V. A. Naishul⁽¹⁾ avait démontré que parmi les points fixes des difféomorphismes du plan, holomorphes ou préservant les aires, lorsque la différentielle est une rotation, l'angle de la rotation est un invariant de nature topologique. Jean-Marc Gambaudo et Élisabeth Pérou ont donné une preuve simple de ce résultat, et on peut extraire de leur argument une définition topologique de ce nombre de rotation. Cependant, une définition générale d'un ensemble de rotation pour les germes d'homéomorphismes de surface n'avait jamais été explicitée ; nous proposons de le faire ici, et d'en commencer l'étude systématique. Le texte contient également un panorama de résultats anciens de dynamique locale, révisités à la lumière de l'ensemble de rotation, et des énoncés nouveaux.

Organisation du texte. — Au premier chapitre, nous rappelons la définition du nombre de rotation dans le cercle, et de l'ensemble de rotation dans l'anneau compact. Nous étendons cette définition au cadre de l'anneau ouvert. Ce chapitre est destiné à aider le lecteur à aborder le chapitre suivant, même si sa lecture n'est pas nécessaire d'un point de vue logique. Le chapitre deux contient les définitions et les premières propriétés de deux invariants, *l'ensemble de rotation local* et *l'intervalle de rotation*

⁽¹⁾ Je n'ai malheureusement pas retrouvé le prénom de Monsieur Naishul.

local. Au chapitre trois nous étudions ce qui se passe lorsque « ça tourne », c'est-à-dire lorsque l'ensemble de rotation n'est ni vide ni réduit à $\{0\}$. Au quatrième chapitre, nous abordons le cas « sans rotation », et notamment l'étude des points fixes isolés dont l'indice de Poincaré-Lefschetz est différent de 1. L'épilogue contient la preuve d'un théorème de dynamique globale illustrant les objets utilisés dans ce texte. Enfin, il nous a paru utile de donner en appendice un aperçu de la dynamique locale des feuilletages, auxiliaires précieux du théorème feuilleté dans l'étude de la dynamique locale des homéomorphismes. Si l'on accepte de considérer les homéomorphismes comme des généralisations des feuilletages orientés, on pourra aussi lire cet appendice comme une introduction à notre étude.

Contenu. — Voici une liste des principaux résultats nouveaux du texte.

- On peut définir un intervalle de rotation local à l'aide de la dynamique sur les courbes passant par le point fixe (section 2.4, proposition 2.4.3).

- L'intervalle de rotation local coïncide avec l'enveloppe convexe de l'ensemble de rotation local (théorème 3.3.1).

- La possibilité d'éclater un point fixe pour le remplacer par un cercle, au sens de Gambaudo-Le Calvez-Pérou, est équivalente à la différentiabilité en ce point, à changement de coordonnées topologique près (proposition 2.3.5). Ces deux propriétés sont impliquées par l'existence d'un germe de courbe disjoint de tous ses itérés (proposition 2.3.3). Ces deux résultats ont été obtenus en collaboration avec François Béguin et Sylvain Crovisier.

- L'ensemble de rotation local permet de détecter certaines orbites périodiques (théorème 3.2.3, corollaire 4.5.2).

- La transversalité locale d'un feuilletage et d'une isotopie est une propriété ouverte (lemme 3.1.3).

Ce dernier lemme permet de perturber un feuilletage transverse pour simplifier sa topologie. Ceci en fait un auxiliaire précieux du théorème feuilleté équivariant de Patrice Le Calvez, en particulier dans la preuve du lien entre ensemble et intervalle de rotation. Le théorème feuilleté équivariant nous permet aussi d'obtenir des démonstrations nouvelles d'énoncés anciens, qui en sortent parfois renforcés : c'est le cas du théorème des trois-quatre points fixes de Matsumoto (théorème 5.1.1), ou pour l'étude des points fixes isolés d'indice différent de un (théorème 4.1.1 et addenda 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4). Nous obtenons en particulier l'existence de secteurs « transversalement hyperboliques », sur lesquels on peut définir une « jolie » fonction de Lyapounov ; à nouveau, le lemme 3.1.3 joue ici un rôle clé.

Remerciements. — Ce texte est basé sur mon mémoire d'habilitation à diriger des recherches. Je remercie les membres du jury et/ou rapporteurs, Jérôme Buzzi, John Franks, Étienne Ghys, Lucien Guillou, Patrice Le Calvez, Jean-Christophe Yoccoz, de leur intérêt pour mon travail. En particulier, la relecture de Patrice m'a été précieuse, et a permis d'épargner au lecteur quelques grosses bêtises. Je remercie également